

Prélèvement des Suppurations closes et séreuses _C2ENRSUPP

Pus profond – Liquide de ponction – Liquide de drain de séreuse

(ne pas utiliser ce formulaire pour les suppurations profondes et ouvertes, ou les suppurations fistulisées, utiliser le formulaire C2ENRLESI)

- **Conservation** selon la nature de l'échantillon :
 - **une seringue stérile ou un flacon stérile** :
Si pus profond : conservation 2 heures à T° ambiante (13 à 30°C), 24 heures à +4°C
Si liquide de ponction : conservation 4 heures à T° ambiante (13 à 30°C)
 - **un flacon stérile avec milieu de transport** : conservation 24 h à T° ambiante (13 à 30°C)
 - **deux écouvillons avec milieu de transport** : conservation 24 h à T° ambiante (13 à 30°C)
- **Identifier la seringue, les écouvillons ou le flacon** avec le nom et prénom du patient, la date et l'heure du recueil.
- **Compléter** les renseignements cliniques et joindre la prescription
- Il est recommandé d'acheminer les prélèvements au laboratoire **dans les plus brefs délais.**

NB : Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom : Nom de naissance :
Prénom : Date de naissance :/...../.....
Date du prélèvement:/...../..... Heure du prélèvement :

Présence de signes cliniques ? Oui Non

Si OUI, lesquels ?
.....

Immunodépression ou traitement immunosuppresseur (corticoïdes,...) ? Oui Non

Traitement antibiotique (ou antifongique) déjà administré ? Oui Non

Si OUI, nom de l'antibiotique (ou antifongique) :

Traitement en cours depuis : Traitement arrêté depuis :

S'agit-il d'un contrôle après traitement antibiotique/antifongique ? Oui Non

Origine du prélèvement ? **PUS PROFOND.** Préciser la localisation :
 LIQUIDE DE PONCTION. Préciser le type de liquide (*entourer*) :
Péritonéal / Ascite / Pleural / Péricardique / Autre :
 LIQUIDE DE DRAIN DE SEREUSE. Préciser la séreuse :