

Prélèvement de Liquide Céphalo Rachidien _C2ENRLCR

• **Prélèvement :**

- **Ponction lombaire:**

En l'absence de contre-indication (hypertension intracrânienne, trouble majeur de la coagulation sanguine, infection locale au point de ponction) et après aseptie de type chirurgical. Prélever **au minimum 3 flacons stériles, avec au moins 10 gouttes de LCR par flacon (~ 500 µL)**. Prélever si possible avant tout traitement antibiotique/antifongique.

- **Prélèvement en cas de dérivation ventriculaire :**

Dérivation externe : au niveau de l'embout en latex du robinet proximal de vidange, après désinfection et manipulation soigneuses. Ne pas prélever dans la poche de recueil.

Dérivation interne : prélever le LCR au niveau lombaire ou à défaut au niveau du réservoir.

- **Identifier les flacons** avec le nom et prénom du patient, la date et heure du recueil
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- **Acheminer les flacons au laboratoire au plus vite (délai max 30 m)** à température ambiante (13°C à 30°C)

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (à compléter)

Nom d'usage:..... Nom de naissance:.....
Prénom :..... Date de naissance :...../...../.....
Date du prélèvement:/...../..... Heure du prélèvement :

Y-a-il suspicion de méningite ou d'infection du SNC ? Oui Non

Préciser : signes cliniques :
diagnostic présumé :

Autres cas dans l'entourage ? Oui Non

Immunodépression ? Oui Non

Si OUI, préciser (*entourer*):
Traitement immunosuppresseur (corticoïdes, chimio,...) / Hémopathie maligne / Infection HIV /
Transplanté / Cancer / Autre :.....

Contexte clinique particulier ? (*entourer*) :

Chirurgie ORL / Neurochirurgie / Traumatisme crânien ou facial / Dérivation ventriculo-péritonéale

Voyage à l'étranger (zone tropicale) précédant l'apparition des symptômes ? Oui Non

Si OUI, préciser pays et date :

Traitement antibiotique (ou antifongique) déjà administré ? Oui Non

Si OUI, nom de l'antibiotique/antifongique :
Traitement en cours depuis : Traitement arrêté depuis :

Mode de prélèvement : PONCTION LOMBAIRE DERIVATION VENTRICULAIRE