





## FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES \_C2ENRKTPAC v02 – PRÉLÈVEMENT DE CATHÉTER, CHAMBRE IMPLANTABLE

### INSTRUCTION CATHÉTER

- Procéder stérilement au retrait du cathéter.
- Placer dans un flacon stérile **les 5 derniers cm de la partie distale d'un cathéter long, ou la totalité de la partie insérée d'un cathéter court.**
- **Identifier le(s) flacon(s)** avec le nom et prénom du patient et la date et l'heure du prélèvement.
- **Compléter** les renseignements cliniques et joindre la prescription.

### INSTRUCTION CHAMBRE IMPLANTABLE (PAC)

- Procéder stérilement au retrait de la chambre implantable.
- Placer dans un flacon stérile la chambre implantable, **avec les éventuels caillots, sérosité, débris** observés au moment du retrait de la chambre.
- **Couper les 5 derniers cm de la partie distale du cathéter**, à placer dans un autre flacon stérile, à fin d'analyse du cathéter.
- **Envoyer au laboratoire en parallèle la chambre implantable et l'extrémité distale du cathéter.**
- **Identifier le(s) flacon(s)** avec le nom et prénom du patient et la date et l'heure du prélèvement.
- **Compléter** les renseignements cliniques et joindre la prescription.

### DÉLAI ET TEMPÉRATURE DE CONSERVATION

**4 heures à températures ambiante (13 à 30°C) ou 24 heures à +4°C**  
Il est recommandé d'acheminer le(s) flacon(s) au laboratoire dans les plus brefs délais

NB : Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats

TRANSMETTRE AU LABORATOIRE LA FICHE COMPLÉTÉE + FLACON  
IDENTIFIÉ ET VOTRE PRESCRIPTION



## FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES \_C2ENRKTPAC v02 – PRÉLÈVEMENT DE CATHÉTER, CHAMBRE IMPLANTABLE

### INSTRUCTION CATHÉTER

- Procéder stérilement au retrait du cathéter.
- Placer dans un flacon stérile **les 5 derniers cm de la partie distale d'un cathéter long, ou la totalité de la partie insérée d'un cathéter court.**
- **Identifier le(s) flacon(s)** avec le nom et prénom du patient et la date et l'heure du prélèvement.
- **Compléter** les renseignements cliniques et joindre la prescription.

### INSTRUCTION CHAMBRE IMPLANTABLE (PAC)

- Procéder stérilement au retrait de la chambre implantable.
- Placer dans un flacon stérile la chambre implantable, **avec les éventuels caillots, sérosité, débris** observés au moment du retrait de la chambre.
- **Couper les 5 derniers cm de la partie distale du cathéter**, à placer dans un autre flacon stérile, à fin d'analyse du cathéter.
- **Envoyer au laboratoire en parallèle la chambre implantable et l'extrémité distale du cathéter.**
- **Identifier le(s) flacon(s)** avec le nom et prénom du patient et la date et l'heure du prélèvement.
- **Compléter** les renseignements cliniques et joindre la prescription.

### DÉLAI ET TEMPÉRATURE DE CONSERVATION

**4 heures à températures ambiante (13 à 30°C) ou 24 heures à +4°C**  
Il est recommandé d'acheminer le(s) flacon(s) au laboratoire dans les plus brefs délais

NB : Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats

TRANSMETTRE AU LABORATOIRE LA FICHE COMPLÉTÉE + FLACON  
IDENTIFIÉ ET VOTRE PRESCRIPTION