

Prélèvement pour recherche d'oeufs d'oxyures (Scotch-test) C2ENRSCOTC

- **Attention, le prélèvement doit être fait le matin, avant toute défécation et toilette, et il ne doit pas y avoir eu de prise de suppositoires.** Si ces conditions ne sont pas réunies, faire revenir le patient un autre jour si possible
- Si le patient est mineur, ne réaliser le prélèvement qu'en présence d'un parent ou d'une autre personne soignante
- **Préconisations pour le prélèvement :**
 - Port de gants
 - Couper une bande de Scotch transparent de 5 cm environ.
 - Faire pencher le patient en avant.
 - Déplier les plis périanaux et appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale, à la périphérie de l'anus (et non pas dans le canal anal). Maintenir le Scotch en appuyant quelques secondes.
 - Retirer le Scotch et l'étaler sur la lame support (bien appuyer pour que l'adhérence soit parfaite et chasser le plus possible les bulles d'air).
- **Identifier la lame** avec le nom et prénom du patient, date et heure du prélèvement
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- Délai et température de conservation : 24 heures à température ambiante (13 à 30 °C)
- **Il est recommandé d'acheminer les prélèvements au laboratoire dans les plus brefs délais**

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom **Nom de naissance:**.....
Prénom : **Date de naissance :**...../...../.....
Date du prélèvement :/...../..... **Heure du prélèvement :**

	OUI	NON
Le patient a-t-il été à la selle ce matin avant le prélèvement ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Une toilette anale a-t-elle été effectuée ce matin avant le prélèvement ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y-a-t-il eu prise de suppositoires avant le prélèvement ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MOTIF(S) de la demande ? (*entourer les réponses souhaitées*) :

Démangeaisons anales / Douleurs abdominales / Diarrhée /

Petits vers blancs (environ 1 cm) vus dans les selles /

Autres :

.....

.....